

èn vogel gelegd waren. Eens heb ik met zekerheid kunnen constateeren, dat een grutto 5 eieren legde in een nest. Van een gruttopaar vond ik 3 eieren, welke ik wegnam. Ruim een week later vond ik van hetzelfde gruttopaar een nest met 5 eieren. Dit is ook zeer begrijpelijk. Van het eerste legsel was èen ei over en daarbij heeft de grutto het tweede legsel bijgelegd.

Utrecht.

J. W. FLIERINGA.

Visdievingeschiedenis. — Op het begroeide strand van de Beer hadden we van de zomer een schuilhut gemaakt bij een visdievennest. Het lag in onze bedoeling, foto's te maken van de oude visdieven bij hun jongen. Nu gaat dat in de regel lastig omdat de jongen al gauw rondlopen en dan natuurlijk uit de scherptelijn van de kamera verdwijnen. Om onze kansen nu groter te maken, schoven we een ei onder dat minstens enige dagen ouder was dan de eieren van onze visdief. Daarvoor zochten we 's avonds een zwaar aangepikt ei in de buurt op, dan was er de volgende morgen een jong bij de schuilhut.



Loogkruid als duinvormer.

De Beer, Aug. 1928.

Dan bleef de oude broeden op de andere eieren, terwijl het jong of onder de vleugels zat of in de buurt rondscharrelde. Een van de ouders kwam dan dikwels voer brengen. En toen kwamen de moeilijkheden. Zolang de Sterns broeden, voeren ze elkaar op 't nest, maar zijn er jongen, dan krijgen deze alles.

Nu was door onze schuld op een ontijdig ogenblik een jong verschenen. Een van de ouden zat echter nog op eieren, zodat nu èn het jong èn de broedende vogel aanspraak maakten op een visje.

Meestal gaf de „visser” zijn buit dadelijk aan het jong, maar soms zag de „broeder” kans, om het in te pikken. Dikwels waren dat miniatuurvisjes (kleine grondeltjes) die duidelijk voor het jong bestemd

Den Haag.

N. TINBERGEN.

Koekoeksei in rietgorzennest. — Op 3 Juni j.l. vond ik op een eilandje van het Braassemermeer een rietgorzennest inhoudende 4 eieren, waarvan er èen een *Koekoeksei* was. Hoewel de nieuwe Naumann onder de 145 vogelsoorten, in het nest van welke *Cuculus canoris* wel eens een ei gedeponerd heeft, ook *Emberiza schoeniclus* noemt, meen ik toch, dat in Nederland, voor zoover ik weet nog geen opgave werd gedaan van een koekoeksei bij genoemde soort; althans heb ik bij verschillende auteurs dit feit niet kunnen vinden en achtte ik het de moeite waard het hier te vermelden.

In *kneuen* en *groenlingennesten* worden wel meer koekoekseieren aangetroffen. Wat komt in deze gevallen van den jongen koekoek terecht?